용법용량

1. 성인 : 통상 식사와 무관하게 1회 2정을 1일 2회, 오전 및 취침전에 복용한다

1) 위궤양 및 십이지장궤양

1회 2정을 1일 2회 투여하거나, 1회 4정을 1일 1회, 취침전에 투여한다. 특히 십이지장궤양환자에 대해서 1회 4정, 1일 2회, 오전 및 취침 전에 투여하면 보다 높은 치료율을 얻을 수 있다

비스테로이드성 소염진통제 투여로 인한 궤양 또는 비스테로이드성 소염진통제 장기투여시 위.십이지장궤양 발생을 예방하기 위한 병용요법에 있어서도 용량은 같다. 보통은 4주 이내, 비스테로이성 소염 진통제 투여로 인한 질환은 보통 8주 이내에 치유되나 간혹 환자에 따라 치유기간이 연장될수 있다.

이 약의 단기요법으로 효과가 우수하였던 재발성 궤양환자들에 대해서는 유지요법으로 1회 2정을 1일 1회 취침전에 투여한다

2) 역류성 식도염

8주 동안 1회 2정 1일 2회 투여하거나, 1회 4정을 1일 1회, 취침전에 투여한다

단, 중증 역류성 식도염 환자에 대해서는 1회 4정을 1일 4회로 증량할 수 있다

3) 졸링거엘리슨 증후군

초기용량으로서 1회 2정을 1일 3회로 치료를 시작하며 필요에 따라 증량할수 있다. 중증질환의 경우 의사의 지시에 따라 1일 라니티딘으로서 6g까지 투여할 수 있다.

4) 소화성궤양, 급성 스트레스성 궤양 및 급성위점막 병변의 상부소화관출혈 경구투여가 가능해지면, 주사에서 경구토여로 전환하여 1회2정을 1일 2회 투여한다

5) 마취유도 2시간 전에 1회 2정을 투여한다. 이 경우 수술전야에도 1회 2정을 투여하면 더 좋다

2. 소아 : 소아에 대한 임상연구는 확립되어 있지 않으나, 8-18세의 소아의 경우 1회 2정(라니티딘으로서 2mg/kg)을 1회 2회까지 복용할수 있다

3. 신장애 환자 : 크레아티닌 청소율 50ml/min이하인 심한 신장애 환자의 경우, 1회 2정을 1일 1회, 취침전에 복용한다. 이는 환자의 상태에 따라 달라질수 있으며 혈액투석이 약물의 혈중농도를 감소시키므로 혈액투석 직후 투약계획을 재조정한다