사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자

2) 임부 및 수유부

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

환부가 광범위한 환자(부작용이 나타나기 쉽다)

3. 부작용

1) 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

2) 국소자극, 발적, 피부염 등의 증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.

3) 드물게 접촉 알레르기 반응, 수포가 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

1) 환부가 심한 화농, 습윤, 미란(짓무름) 등일 경우에는 이를 미리 치료한 후 이 약을 사용한다.

2) 이 약으로 치료하는 동안 현저한 자극 또는 과민반응이 나타나면 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

3) 이 약을 사용한 지 4주 이내에 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 하고 적절한 치료를 하는 것이 바람직하다.

4) 세균 또는 이 약에 비감수성인 진균에 중복 감염된 경우에는 추가적인 국소적 또는 전신적 치료가 필요하다.

5) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.

6) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.

7) 의사의 지시가 없는 한 밀봉붕대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.

5. 적용상의 주의

1) 이 약은 외용으로만 적용한다

2) 이 약은 안과용으로 사용하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.