사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

알릴아민계 항진균제에 민감한 환자(교차반응이 나타날 수 있다)

3. 부작용

피부 : 때때로 국소자극감, 발적 (충혈되어 붉어짐), 홍반(붉은 반점), 가려움, 접촉피부염, 수포(물집), 드물게 미란(짓무름), 인설(비늘껍질), 균열(틈새,열창)이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

1) 이 약 사용으로 인해 자극 또는 민감성이 나타나면 치료를 중지하고 적절한 요법을 실시한다.

2) 수산화칼륨용액으로 직접적인 현미경적 검사 또는 적당한 배지에 배양함으로써 질병의 진단을 확인할 수 있다.

3) 의사의 지시가 없는 한 밀봉붕대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.

4) 적응증 이외의 질환에 이 약을 투여하지 않는다.

5) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행한다.

6) 이 약은 안식향산 나트륨을 포함하고 있으며, 안식향산은 피부, 눈, 점막에 경미(가벼운,대수롭지않은)한 자극이 될 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신 중의 사용에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 이 약의 모유로의 이행 여부에 대해 알려진 바 없으나 많은 약물들이 모유로 이행하므로 수유부에 이 약 투여시 주의한다.

6. 소아에 대한 투여

미숙아, 신생아 및 12세 이하의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.

7. 적용상의 주의

1) 이 약은 외용으로만 적용한다.

2) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다.

3) 심한 미란(짓무름) 부위에는 사용하지 않는다.

4) 족부백선(발백선증,무좀), 체부백선, 완선(사타구니백선(증)) 환자의 환부(질환부위) 및 그 주위의 피부를 덮을 수 있도록 이 약을 충분히 적용한다.

5) 이 약을 적용하기 전에 환부를 깨끗이 씻고 완전히 건조시킨 후에 적용하며 적용후에는 손을 씻는다.

8. 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.