사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

1) 30개월 이하의 유아

2) 창상(상처)면, 눈 주위, 점막 등

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 지금까지 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가 려움, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 환자

2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 환자

3) 습윤(습기 참)이나 미란(짓무름)이 심한 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5) 소아(경련을 유발할 수 있다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 피부: 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 가려움 등

2) 5~6일간 사용해도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.

3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.

4) 눈에 들어가지 않도록 주의하며, 만일 눈에 들어간 경우에는 즉시 물로 씻을 것. 증상이 심할 경우에는 안과의사의 치료를 받을 것.

5) 사용 전에 잘 흔들 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

4) 사용 후 반드시 캡을 충분히 닫을 것.

5) 화기 근처에 두지 말 것.

6) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉하면 변질하는 일이 있으 므로 접촉하지 않게 주의할 것.