사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하지 말 것.

1) 이 약의 성분에 대하여 과민증의 기왕력이 있는 환자

2) 눈 또는 눈 주위, 점막 등

2. 다음과 같은 사람(부위)은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약이나 화장품등에 의한 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움증, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람

2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자는 신중히 투여한다.

3) 습윤이나 짓무름이 심한 사람

4) 의사의 치료를 받고 있는 사람

5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

6) 유·소아

7) 고령자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

이 약의 사용으로 인해 발진, 발적, 통증, 가려움 및 자극 등의 증상이 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.

3) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻어낼 것.

4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 말 것.

5) 안과용으로 사용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.