# 용법용량

1. 성인

: 초기에 피라세탐으로서 1회 1g 1일 3회 정맥 또는 근육주사한다. 증상에 따라 의사의 지시하에 1일 12g 까지 정맥주사할 수 있다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

2. 노인

신기능이 저하된 노인 환자에서는 용량 조절이 권장된다(아래의 '신장애 환자'에 서의 용량 조절 방법을 참조). 노인을 장기간 치료할 때, 필요에 따라 용량을 조 절하기 위해서는 크레아티닌 청소율에 대한 정기적인 평가가 필요하다.

3. 신장애 환자

1일 용량은 반드시 신기능에 따라 개별적으로 정해야 한다. 아래의 표를 참고하 여 지시된 대로 용량을 조절해야 한다. 이 용량표를 이용할 때 환자의 크레아티닌 청소율(CLcr)이 필요하다. mL/min 단위로 표시한 크레아티닌 청소율(CLcr)은 다 음의 공식을 이용하여 혈청 크레아티닌 수치(mg/dl)로부터 추정할 수 있다.

- 다 음 -

| | | |
|---|---|---|
| CLcr(mL/min) = | [140-연령(세)] X 체중(kg)<br>72 X 혈청 크레아티닌(mg/dl) | (여성인 경우X0.85) |

| 분류 | 크레아티닌 청소율 (mL/min) | 용법 용량 |
|---|---|---|
| 정상 | ≥ 80 | 1일 용량과 동일, 2~4회 분할 투여 |
| 경증 | 50-79 | 1일 용량의 2/3, 2~3회 분할 투여 |
| 중등도 | 30-49 | 1일 용량의 1/3, 2회 분할 투여 |
| 중증 | < 30 | 1일 용량의 1/6, 1회 투여 |
| | < 20 | 투여 금기 |