사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

1) 협우각 녹내장 환자

2) 눈의 통증, 시력변화, 지속적인 충혈이나 자극감을 경험하거나, 증상이 악화되거나 72시간 이상 지속되면 투약을 중단하고 의사와 상의한다.

2. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 외용(점안용)으로만 사용한다.

2) 이 약은 고의적으로 혹은 실수로 과도하게 사용하면(우연한 경구 섭취 포함) 심각한 심혈관 및/또는 뇌혈관 부작용을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

3) 만약 이 약의 색상이 변했거나 혼탁해졌으면 사용하지 않는다.

4) 오염을 피하기 위하여 용기의 입구가 다른 곳에 닿지 않도록 한다.

5) 사용후에 캡을 교체한다.

6) 과량 사용할 경우 눈의 충혈을 증가시킬 수 있다.

7) 일시적으로 동공을 확대시킬 수 있다

8) 사용하기 전에 소프트렌즈를 제거한다.

3. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 것에 보관할 것

2) 이 약을 복용했을 경우, 즉시 전문가의 도움을 받는다.