효능효과

○ 유효균종

황색포도구균(페니실린내성균포함, 메치실린내성균제외), 표피포도구균(메치실린내성균제외), 인플루엔자균(암피실린내성균 포함), 파라인플루엔자균(암피실린내성균 포함), 클레브시엘라, 스트렙토콕쿠스 피오게네스(그룹A-베타용혈성), 스트렙토콕쿠스 아갈락티에(그룹B), 폐렴연쇄구균, 대장균, 스트렙토콕쿠스 비리단스, 클로스트리듐(클로스트리듐 다이피셀 제외), 프로테우스 미라빌리스, 프로비덴시아 레트게리, 장티푸스균 및 기타 살모넬라, 시겔라, 나이세리아(베타락타마제를 분비하는 임균류 포함), 보르데텔라 백일해, 모락셀라 카타랄리스, 프로테우스 불가리스, 모르가넬라 모르가니, 엔테로박터, 시트로박터, 세라티아, 스트렙토콕쿠스 파이칼리스, 박테로이즈 프라질리스

○ 적응증

- 급만성기관지염, 기관지확장증(감염 시), 세균성폐렴, 폐농양, 수술 후 흉부감염

- 부비동염, 편도염, 인두염

- 급·만성 신우신염, 방광염, 무증후성 세균뇨, 임질

- 연조직염, 단독, 창상감염

- 복막염

- 골수염, 패혈성관절염

- 패혈증, 수막염

- 자궁부속기염, 자궁내감염, 골반사강염, 바토린선염, 자궁주위조직염

- 수술 후 감염 예방(복부, 골반, 정형외과, 심장, 폐, 식도, 혈관수술)