용법용량

항 당뇨병용 약제는 환자 개개인의 혈당치에 따라 용량을 조절하여야 한다.

이 약의 초기용량은 아래를 참고하여 가능한 저용량으로 개시한다.

1) 기존의 설포닐우레아 또는 메트포르민 단독요법으로 혈당이 적절히 조절되지 않는 경우 :

통상적으로 글리메피리드/메트포르민염산염으로서 1일 2/500mg이 초기용량 으로 사용되며, 환자의 현재 복용중인 약물과 혈당치를 고려하여 용량을 조 절할 수 있다. 이 약물 사용 전에 반감기가 긴 설포닐우레아계 약물(예, 클로르프로 파미드 등)을 사용한 경우는 과도한 약리작용으로 인한 저혈당이 발현되지 않도록 조심스럽게 모니터링 하여야 한다.

2) 병용요법의 대체로 사용할 경우 :

글리메피리드 및 메트포르민염산염의 기존 1일 투여 용량과 동일한 용량을 투여한 다.

필요한 경우, 각 환자의 현재 치료요법, 유효성, 내약성을 고려하여 각 성분의 최대 권장용량인 글리메피리드 8mg, 메트포르민 2000mg을 넘지 않는 범위에서 증량하며, 이를 위해 적절한 혈당 모니터링이 이루어져야 한다. 글리메피리드는 일반적으로 4mg 이상의 용량을 투여했을 때 추가 효과는 거의 없지만, 몇몇 환자들은 6mg(또는 8mg)까지 증량시킴으로써 더 나은 대사조절을 보였다.

이 약은 아침 또는 주된 식사 직전이나, 식사와 함께 1일 1회 투여한다.

복용을 못한 경우라도 다음 복용 시 1회 용량을 초과해 복용해서는 안 된다.

이 약은 서방성 제제이므로 부수거나 씹어먹지 말고 전체를 삼켜야 한다. (일반적 주의사항 참조)