사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

3) 코점막 부위

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

1) 이 약의 주성분과 보존제가 모유 중으로 분비되는지에 대하여 알려져 있지 않으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하지 않거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.

2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

이 약에 포함된 프로필렌글리콜에 과민반응의 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 매우 드물게 피부 화끈감 등의 과민반응

2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 오·남용(잘못사용하거나 많이 사용)을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.