용법용량

(연고제)

1일 1회 환부에 적당량을 도포한다.

권장치료기간은 4주이며, 이 기간 후에 의사의 감독 하에 반복적으로 치료를 시작할 수 있다.

최대투여용량은 1일 15 g이며, 1주당 100 g을 초과하지 않는다.

체표면적은 30 %를 초과해서는 안된다.

(겔제)

이 약은 1일 1회 환부에 적용한다. 두피에는 4주간, 두피 외 부위에는 8주간의 사용을 권장한다. 이 기간 후에는 의사의 감독 하에 반복적으로 사용할 수 있다.

하루 사용량은 15 g을 넘지 말아야 하며, 한 주간 최대 사용량은 100 g을 넘지 말아야 한다. 이 약에 함유된 칼시포트리올이 적용되는 체표면적은 30 %를 넘어서는 안된다.

두피에 사용하는 경우, 환부 전체에 이 약을 사용한다. 보통 두피에는 하루에 1 g에서 4 g 사이의 양이면 충분하다.(4 g은 1티스푼에 해당한다).

이 약은 얼굴이나 눈에 직접 사용해서는 안된다. 이상적인 효과를 얻기 위해, 이 약의 사용 후 바로 샤워를 하거나 머리를 감는 것을 권장하지 않는다. 이 약은 밤 또는 낮 시간대에 피부에 남아있어야 한다.

어플리케이터 사용시 : 어플리케이터를 사용하기 전에 어플리케이터의 앞부분에 카트리지를 끼워넣는다. 어플리케이터를 한번 누르면 이 약 0.05 g이 나온다. 만약 이 약이 손에 묻으면, 사용 후 손을 씻어야 한다.

플라스틱 병 사용시 : 이 약을 사용전에 병을 흔든다. 사용 후 손을 씻는다.