사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 눈의 통증이 심한 사람

2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종(부기), 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 사람

3) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4) 안구건조증후군 진단을 받은 사람

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 이 약의 투여에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

눈의 충혈, 가려움, 부종(부기)

피부의 발진, 발적, 가려움

2) 수일간 투여후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

3. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 사용할 것

3) 이 약은 세안용으로만 사용할 것.

4) 콘택트렌즈의 장착액으로 또는 콘택트렌즈를 착용한 채 사용하지 말 것. 또한 이 약으로 세안한 후 10~15분 정도 경과 후 콘택트렌즈를 장착할 것

5) 오염을 방지하기 위해 세안컵은 공동으로 사용하지 말 것. 또 사용전후에는 수돗물에 충분히 씻을 것.

6) 눈의 상처에는 사용하지 말 것.

7) 혼탁한 제품은 사용하지 말 것.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 닫아 보관할 것.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.