용법용량

1. 고혈압

성인 나도롤로서 1일 40㎎으로 경구투여하여 최적반응이 나타날 때까지 1주일 간격으로 점차 증량한다. 환자의 상태에 따라 1일 최대 240㎎까지 투여할 수 있다.

2. 협심증

이 약으로서 1일 40㎎으로 시작하여 최적반응이나 과도의 서맥이 나타날 때까지 1주일 간격으로 점차 증량한다. 환자의 상태에 따라 1일 최대 160㎎까지 투여할 수 있다.

3. 빈맥성부정맥

이 약으로서 1일 40㎎으로 시작하여 1주일 간격으로 점차 증량하여 1일 최대 160㎎까지 증량할 수 있다. 서맥이 나타나면 1일 40㎎으로 감량한다.

4. 편두통의 예방

이 약으로서 1일 40㎎으로 시작하여 최적반응이 나타날 때까지 점차 40㎎씩 증량한다. 보통 유지용량은 1일 80-160㎎이다. 최대용량에서 4-6주 후에도 만족할 만한 반응이 얻어지지 않으면 이 치료법은 점차 중지한다.

5. 갑상선중독증

이 약으로서 1일 80-160㎎을 투여하며 대부분의 환자는 1일 160㎎을 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.