사용상의주의사항

1. 경고

1) 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되. 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의할 것.

2) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 비타민 B12와 그 유사체에 과민증 환자

2) 악성종양 환자(조직발육에 대한 비타민 B12의 작용으로 세포의 증식속도가 증가하지만 그 위험율에 대한 자료는 확실하지 않다.)

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

비타민 B12와 그 유사체의 투여후에 나타나는 면역성 과민증은 매우 드물게 치명적일 수 있으므로 토양성 알레르기(천식, 습진)를 나타내는 환자에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

4. 부작용

1) 과민증 : 드물게 가려움증, 두드러기, 홍반, 일과성의 발진, 쇽 등이 일어날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.

2) 피부 : 여드름이 생길 수 있다.

3) 기타 : 요의 착색이 나타날 수 있다.

5. 적용상의 주의

근육주사시 동통을 일으킬 수 있다.