사용상의주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 본인 또는 상대방이 이 약 또는 기타의 아미드계 국소마취제에 과민증인 경우

2) 적용 부위에 외상 또는 염증 환자

3) 상대방이 임신중인 경우

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 간·신질환 환자

2) 이 약은 프로필렌글리콜 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 경력

이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 일반적 주의

1) 본인 또는 상대방에 발진 또는 자극이 나타나는 경우에는 이 약의 사용을 중지하고 증상이 계속되는 경우에는 의사와 상담한다.

2) 의사의 감독을 받지 않고 3개월 이상 이 약을 사용하지 않는다.

4. 적용상의 주의

1) 외용으로만 사용하며 눈 또는 코에 사용하지 않는다.

2) 동일한 부위에 연속해서 도포하지 않는 것이 바람직하다.

5. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 유·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 40℃이상의 고온 또는 저온의 장소, 일광이 닿는 곳에 보관하지 않는다.

3) 사용 후 불속에 버리지 않는다.