사용상의주의사항

1. 다음 환자에 사용하지 말 것.

1) 퍼옥사이드에 과민증이 있는 환자

2) 구강 내 감염 또는 상처가 있는 환자

3) 임부 및 수유부

4) 18세 미만의 소아

2. 부작용

잇몸, 치아 및 위장관 자극(심한 경우 염증을 유발할 가능성이 있음)

3. 일반적 주의

1) 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용해야 한다.

2) 먹지 말 것. 실수로 삼켰을 때는 즉시 토해 내야 한다.

3) 가능하면 잇몸에 직접 닿지 않게 하고, 만일 접촉되었을 경우에는 즉시 물로 씻어내야 한다.

4) 치료 중 잇몸, 치아 또는 위장관에 자극이 있으면 즉시 치료를 중지하고, 구강 내를 물로 여러 차례 씻어낸 후 불소 겔로 처치한다. 이 경우 본 제품의 계속 사용 여부를 반드시 치과의사와 상의한다.

5) 눈에 들어가지 않도록 주의하고, 접촉했을 경우에는 즉시 물로 씻어내고 의사와 상의한다.

6) 치료 중 담배, 커피 및 쥬스를 금하는 것이 바람직하다.

4. 보관상의 주의

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 한다.

2) 사용 중 남은 재료는 반드시 냉장고에 보관한다.