사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것

이 약의 구성성분 및 단백질계 약물에 과민반응 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

1) 눈의 통증이 심한 사람

2) 지금까지 안약에 의한 알레르기 증상(예를 들어 눈의 충혈, 가려움, 부종, 발진, 충혈되어 붉어짐 등)을 일으킨 적이 있는 사람

3) 녹내장 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부분서를 소지할 것

1) 드물게 눈 자극이 나타날 경우

2) 증상이 악화되거나 3일 이상 증상이 지속되는 경우

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

2) 이 약은 점안용으로만 사용한다.

3) 사용하기 전에 손을 철저히 씻는다.

4) 아래 눈꺼풀을 부드럽게 아래로 당기고 위를 보는 동안 아래 결막낭에 한 방울 점안한다.

5) 이 약을 다른 점안제와 동시에 사용할 경우에는 다른 점안제를 사용하고 약 10분 후에 이 약을 점안한다.

6) 1회용 제품의 경우 최초 사용 시 1~2방울은 점안하지 않고 버린다(개봉시의 용기 파편을 제거하기 위함).

7) 개봉한 후에는 1회만 사용한다(1회용 제품에 한함).

8) 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의한다. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 않는다.

9) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.

10) 이 약은 콘택트렌즈 착용 중에도 사용할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.