사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
   30개월 이하의 유아

2. 이 약은 다음의 신체 부위에는 사용하지 말 것.
   1) 눈 또는 눈주위, 점막 등
   2) 습진, 상처부위, 민감한 피부

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
   특히, 벗겨진 피부 표면 또는 물집이 있는 부위에 다량을 사용하지 말 것.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
   1) 약이나 화장품 등에 의한 알레르기 증상(예를 들면 발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 옻 등에 의한 피부염 등)이 나타난 적이 있는 사람
   2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
   3) 습윤[습기 참]이나 짓무름, 염증이 심한 사람
   4) 의사의 치료를 받고 있는 사람
   5) 소아(경련을 유발할 수 있다.)

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
   1) 이 약의 사용으로 인해 발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 부종 등의 증상이 나타나는 경우
   2) 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
   1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
   2) 소아에 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
   3) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복 또는 흡입하지 말 것.
   4) 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일 눈에 들어간 경우에는 물로 씻을 것. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 치료를 받을 것.

7. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용[잘못 사용]에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 말 것.

5) 시계, 안경 등의 플라스틱류, 도장이 되어있는 마루, 가구 등에 접촉 시 변질될 수 있으므로 닿지 않게 주의할 것.